

大腸癌

みなと医療生活協同組合 協立総合病院

2025.5

大腸癌①

レジメン名	投与薬剤	投与日	投与量	1クール	備考	
5-FU+I-LV	5-FU(持続)	Day1	2400mg/m ² /46hr	2週間	イリノテカン・オキサリプラチンが使用できない症例に使用	
	5-FU(急速)		400mg/m ²			
	+BEV		ベバシズマブ			5mg/kg
	+Cmab		アービタックス			500mg/m ²
	+Pmab		ベクティビックス			6mg/kg
	+RAM		サイラムザ			8mg/kg
FOLFIRI-1	5-FU(持続)	Day1	2400mg/m ² /46hr	2週間	インフューザーポンプを使用する場合は外来で投与可能	
	5-FU(急速)		400mg/m ²			
			イリノテカン			150mg/m ²
	+AFL		ザルトラップ			4mg/kg
	+BEV		ベバシズマブ			5mg/kg
	+Cmab		アービタックス			500mg/m ²
	+Pmab		ベクティビックス			6mg/kg
	+RAM		サイラムザ			8mg/kg

大腸癌②

レジメン名	投与薬剤	投与日	投与量	1クール	備考	
mFOLFOX-6	5-FU(持続)	Day1	2400mg/m ² /46hr	2週間	インフューザーポンプを使用する場合は外来で投与可能	
	5-FU(急速)		400mg/m ²			
	オキサリプラチン		85mg/m ²			
	+BEV		ベバシズマブ			5mg/kg
	+Cmab		アービタックス			500mg/m ²
+Pmab	ベクティビックス	6mg/kg				
mFOLFOXIRI	5-FU(持続)	Day1	2400mg/m ² /46hr	2週間	インフューザーポンプを使用する場合は外来で投与可能	
	オキサリプラチン		85mg/m ²			
	イリノテカン		150mg/m ²			
	+BEV		ベバシズマブ			5mg/kg

大腸癌③

レジメン名	投与薬剤	投与日	投与量	1クール	備考	
IRIS	エスワン	Day1-14	※	4週間	※エスワン投与量 1.25㎡未満 80mg/日、1.25～1.5㎡未 満 100mg/日、1.5㎡以上 120mg/日	
	イリノテカン	Day1,15	125mg/㎡ or 100mg/㎡ (BEV/Pmab併用時)			
	+BEV		ベバシズマブ			5mg/kg
	+Pmab		ベクティビックス			6mg/kg
SOX	エスワン	Day1-14	※	3週間	※エスワン投与量 1.25㎡未満 80mg/日、1.25～1.5㎡未 満 100mg/日、1.5㎡以上 120mg/日	
	オキサリプラチン	Day1	130mg/㎡			
	+BEV		ベバシズマブ			5mg/kg
	+Pmab		ベクティビックス			6mg/kg
mXELIRI	カペシタビン	Day1-14	2000mg/㎡/day	3週間	* UGT1A1遺伝子多型を有する場合は 150mg/㎡	
	イリノテカン	Day1	200mg/㎡ *			
	+BEV		ベバシズマブ			7.5mg/kg

大腸癌④

レジメン名	投与薬剤	投与日	投与量	1クール	備考
XELOX	カペシタビン	Day1-14	2000mg/m ² /day	3週間	術後補助療法の場合は8クール
	オキサリプラチン	Day1	130mg/m ²		
+BEV	ベバシズマブ		7.5mg/kg		
S-1	エスワン	Day1-28 or 1-14(BEV併用時)	※	6週間 or 3週間 (BEV併用時)	※エスワン投与量 1.25m ² 未満 80mg/日、1.25~1.5m ² 未満 100mg/日、1.5m ² 以上 120mg/日
	+BEV	ベバシズマブ	Day1	7.5mg/kg	
Cape	カペシタビン	Day1-14	2000mg/m ² /day	3週間	
	+BEV	ベバシズマブ	Day1		
UFT+LV	ユーエフティー	Day1-28 or 1-21(BEV併用時)	300mg/m ² /day	5週間 or 4週間 (BEV併用時)	非併用時は4投1休、BEV併用時は3投1休
	ホリナート		75mg/body/day		
+BEV	ベバシズマブ	Day1,15	5mg/kg		

大腸癌⑤

レジメン名	投与薬剤	投与日	投与量	1クール	備考
Cmab+ENCO	アービタックス	Day1,15	500mg/m ²	4週間	
	ビラフトビ	Day1-28	300mg/body/day		
+BINI	メクトビ			90mg/body/day	
Cmab単独	アービタックス	Day1	500mg/m ²	2週間	
CPT-11	イリノテカン	Day1	150mg/m ²	2週間	
+Cmab	アービタックス		500mg/m ²		
+Pmab	ベクティビックス		6mg/kg		
PER+HER	パージェタ	Day1	初回840mg/body、 2回目以降 420mg/body	3週間	
	トラスツズマブ		初回8mg/kg、 2回目以降6mg/kg		
Pmab単独	ベクティビックス	Day1	6mg/kg	2週間	
UFT単独	ユーエフティー	毎日	300～600mg /body/day	毎日	

大腸癌⑥

レジメン名	投与薬剤	投与日	投与量	1クール	備考
オプジーボ+ヤーボイ (1-4クール)	オプジーボ	Day1	240mg/body	3週間	5クール目以降のオプジーボ単独時期 は、2週間隔 or 4週間隔
	ヤーボイ		1mg/kg		
オプジーボ+ヤーボイ (5クール目以降)	オプジーボ	Day1	240mg/body	2週間	
			480mg/body	4週間	
キイトルーダ単独	キイトルーダ	Day1	200mg/body	3週間	
			400mg/body	6週間	
スチバーガ	スチバーガ	Day1-21	160mg/day	4週間	
ロンサーフ	ロンサーフ	Day1-5, 8-12 or Day1-5, 15-19(BEV との併用で 隔週投与時)	※	4週間	※ロンサーフ投与量 1.07㎡未満 70mg/日、1.07～1.23㎡未 満 80mg/日、1.23～1.38㎡未満 90mg/日、1.38～1.53㎡未満 100mg/ 日、1.53～1.69㎡未満 110mg/日、1.69 ～1.84㎡未満 120mg/日、1.84～1.99 ㎡未満 130mg/日、1.99～2.15㎡未満 140mg/日、2.15㎡以上 150mg/日
+BEV	ベバシズマブ	Day1,15	5mg/kg		